

頭頸部がん (Hand and Neck Cancer)

・d1=1日目、d1-28=初日から28日間

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
GDDP+RT	CDDP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	d1	3週毎	Weekly30~40mg/m ²
Cmab+RT	C-mab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目250mg/m ²	点滴	2時間⇒60分	d1	1週毎	8コース
FP+Cmab	5-FU	5-フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴	24時間	d1-4	3週毎	800/80も考慮
	CDDP	シスプラチン	100mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	C-mab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目250mg/m ²	点滴	2時間⇒60分	d1		
TPF	5-FU	5-フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴	24時間	d1-5	4週毎	750/70/70or 750/75/75 3週毎も考慮
	CDDP	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴	60分	d1		
FP+Pembro	5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	24時間	d1-4	3週毎	KEYNOTE-048 進行・再発
	CDDP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1		
PTX+Cmab	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1	1週毎	
	C-mab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目250mg/m ²	点滴	2時間⇒60分	d1		

オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	CheckMate 141
			480mg固定/回	点滴			4週毎	
キイトルーダ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	KEYNOTE-048
			400mg固定/回	点滴			6週毎	

S-1 単剤	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	40~60mg/回	経口	1日2回	d1-28	6週毎	2週投与1週休薬あり
wPTX 単剤	PTX	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴	60分	d1・8・15・22・29・36	7週毎	
DTX 単剤	DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴	60分	d1	3週毎	最大75mgまで

頭頸部がん (Hand and Neck Cancer)