

甲状腺がん(Thyroid Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
レンビマ®	LEN	レンバチニブ	24mg/回	経口	1日1回	連日	-	SELECT試験
レットヴィモ®(未採用)	-	セルペルカチニブ	160mg/回	経口	1日2回	連日	-	RET融合遺伝子陽性

甲状腺がん(Thyroid Cancer)

消化管間質腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor: GIST)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
グリベック®	-	イマチニブ	400mg/回	経口	1日1回	連日	-	Highリスク3年間
スーテント®	-	スニチニブ	50mg/回	経口	1日1回	d1-28	6週毎	2週投与1週休薬あり
スチバーガ®	-	レゴラフェニブ	160mg/回	経口	1日1回	d1-21	4週毎	GRID試験

消化管間質腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor: GIST)

皮膚がん(Skin Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	術後補助:12ヶ月間
			480mg固定/回	点滴	30分	d1	4週毎	
Ipi+Nivo	Nivo	ニボルマブ	80mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	4コース
	Ipi	イピリムマブ	3mg/kg	点滴	30分	d1		
キイトルーダ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	術後補助:12ヶ月間
			400mg固定/回	点滴	30分	d1	6週毎	
タフィンラー®	-	ダブラフェニブ	150mg/回	経口	1日2回	連日	-	BRAF遺伝子変異陽性 術後補助:12ヶ月
+メキニスト®	-	トラメチニブ	2mg/回	経口	1日1回	連日	-	
ゼルボラフ®	-	ベムラフェニブ	960mg/回	経口	1日2回	連日	-	BRAF遺伝子変異陽性

皮膚がん(Skin Cancer)