

## 骨軟部悪性腫瘍 (Bone and Soft Part Malignant Tumor)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ADM 単剤	ADM	ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	15分	d1	3週毎	
AI	ADM	ドキソルビシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴	15分	d1・2	3週毎	術前3コース (+術後2コース)
	IFM	イホスファミド	2g/m <sup>2</sup>	点滴	4時間	d1-5		
GEM+DTX	GEM	ゲムシタビン	900mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	3週毎	
	DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d8		

PTX 単剤	PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1・8・15	4週毎	血管肉腫
ヨンデリス®	-	トラベクテジン	1.2mg/m <sup>2</sup>	点滴	24時間	d1・2	3週毎	
ハラヴェン®	ERI	エリ布林	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	d1・8	3週毎	
ヴォトリエント®	Pazo	パゾパニブ	800mg/回	経口	1日1回	連日	-	
スーテント®	-	スニチニブ	50mg/回	経口	1日1回	d1-28	6週毎	

TI	PTX	パクリタキセル	135mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	d1-3	3週毎	子宮癌肉腫
	IFM	イホスファミド	1.6g/m <sup>2</sup>	点滴	4時間	d1-3		
	Mesna	メスナ	300mg/m <sup>2</sup> × 3	点滴	30分	d1-3		

## 骨軟部悪性腫瘍 (Bone and Soft Part Malignant Tumor)

### 原発不明がん (Cancer of Unknown Primary)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
TC	PAC	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	d1	3週毎	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	点滴	1時間	d1		
オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	NM-K2002/NivoCUP
			480mg固定/回	点滴	30分	d1	4週毎	

### 原発不明がん (Cancer of Unknown Primary)