

慢性骨髄性白血病(Chronic Myelogenous Leukemia: CML)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
グリベック®	-	イマチニブ	400~800mg/日	経口	1日1回	連日		800mgは分2へ
タシグナ®	-	ニロチニブ	600~800mg/日	経口	1日2回	連日		空腹時
スプリセル®	-	ダサチニブ	100~180mg/日	経口	1日1~2回	連日		食後
ポシュリフ®	-	ポストチニブ	400~600mg/日	経口	1日1回	連日		食後
アイクルシグ®	-	ポナチニブ	45mg/日	経口	1日1回	連日		

慢性骨髄性白血病(Chronic Myelogenous Leukemia: CML)

慢性リンパ性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia: CLL)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
FCR	RTX	リツキシマブ	375⇒500mg/m ²	点滴	2~4時間	d0(別日あり)	4週毎	6コース
	CPA	シクロホスファミド	250mg/m ²	点滴	60分	d1-3		
	F-ara-A	フルダラビン	25mg/m ²	点滴	30分	d1-3		
FC	CPA	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴	60分	d1	4週毎	
	F-ara-A	フルダラビン	20mg/m ²	点滴	30分	d1-5		
RB	RTX	リツキシマブ	375⇒500mg/m ²	点滴	2~4時間	d0(別日あり)	4週毎	
	BEN	ベンダムスチン	70-100mg/m ²	点滴	60分	d1-2		
フルダラ	F-ara-A	フルダラビン	40mg/m ²	経口	1日1回	d1-5	4週毎	マンツル細胞リンパ腫
イムブルビカ®	-	イブルチニブ	420mg/回	経口	1日1回	連日	-	CLL/SLLを含む・マンツル細胞リンパ腫
ベネクレスタ®	-	ベネトクラクス	20→50→100→200→400mg/回	経口	1日1回	連日	-	

慢性リンパ性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia: CLL)

急性骨髄性白血病(Acute Myelogenous Leukemia: AML)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ビダーザ®+ ベネクレスタ®	Aza	アザシチジン	75mg/m ²	皮下、点滴	10分	d1-7	4週毎	
	-	ベネトクラクス	100→200→400mg/回	経口	1日1回	連日		

急性骨髄性白血病(Acute Myelogenous Leukemia: AML)